Read Leaflet Before Use. उपयोग से पहले लीफलेट पढ़ें। વપરાશ પહેલાં પત્રિકા વાંચો.उपयोग करण्यापूर्वी माहितीपत्रक वाचा. ಕಿರಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಓದಿರಿ. ಬಳಕೆಗೆ ಮುಂದು ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಓದಿ. உபயோகத்திற்கு முன் பிரசுரத்தை படிக்கவும். ব্যবহারের আগে লিফলেট পড়ুন। ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ലഘുലേഖ വായിക്കുക. ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପତ୍ରିକା ପଢନ୍ତୁ।

PROCROP™ PROPAQUIZAFOP 10% EC HERBICIDE

Chemical Composition: Propaquizafop a.i. 10.00 %w/w, N Methyl Pyrrolidione-9.80 %w/w, Alcohol Ethoxylate -39.21 %w/w, Castor oil Ethoxylate-1.96%w/w, Mixture of C10-C14 Hydrocarbons-QS%w/w, Total-100.00%w/w. **Precautions**: Protective clothing should be worn while mixing and application. Wash contaminated clothes and body part after application. Avoid inhalation, do not smoke, drink, eat & chew anything during application. **Antidote**- No specific antidote is known. Apply symptomatic therapy. **First Aid**- If ingested: If person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call the doctor. Do not induce vomiting until and unless desired by attending physician. 2. If inhaled: Take the patient to fresh air and take care of body temperature. If patient is not breathing or breathing with difficulty, give artificial respiration, preferably with mouth to mouth breathing. Consult a physician. 3. In case of skin contact: Wash thoroughly the affected part of body with soap and plenty of water including hairs and under fingernails. If pain, redness or irritation persists, consult a doctor. All the contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use. 4. In case of eye contact: Rinse gently with plenty of water for at least 15 minutes. If pain, irritation, redness or photophobia persists, consult eye specialist. **Symptoms & Direction Of Use-** Read enclosed leaflet carefully before use. **Recommendations-** Propaquizafop 10% EC is a post emergence herbicide predominantly effective against Monocot weeds in Soybean, Black gram, Onion, Jute, Cotton, Groundnut, Tomato, Cluster bean, Chickpea, Chilli, Sesamum. **Caution:** "Not to be used on crops other than specified on this Label/Leaflet". For Dosage, please refer leaflet. **Dangerous to Re-use empty containers.**

प्रोक्रॉप प्रोपाक्विज़ाफ़ॉप 10% ईसी खरपतवारनाशक

रासायनिक संरचना: प्रोपेक्विज़ाफॉप 10% ए.आई w/w, एन मिथाइल पायरोलिडियोन-9.80% w/w, अल्कोहल एथोक्सिलेट -39.21% w/w, अरंडी का तेल एथोक्सिलेट-1.96% w/w, C10 - C14 का मिश्रण हाइड्रोकार्बन-QS % w/w, कुल-100.00% w/w **उपयोग की दिशा-** उपयोग से पहले संलग्न पत्रक को ध्यान से पढ़ें। **सावधानियां-** मिश्रण और आवेदन करते समय सुरक्षात्मक कपड़े पहने जाने चाहिए। आवेदन के बाद दूषित कपड़े और शरीर के अंग को धो लें। साँस लेने से बचें, आवेदन के दौरान कुछ भी धूमपान, पीना, खाना और चबाना न करें। **प्रत्यौषध-** कोई विशिष्ट प्रत्यौषध ज्ञात नहीं है। रोगसूचक चिकित्सा लागू करें। **प्राथमिक चिकित्सा-** यदि निगला जाता है: यदि व्यक्ति सचेत और सतर्क है, तो पानी से मुंह कुल्ला करें और पीने के लिए 1 या 2 गिलास पानी दें। बेहोश व्यक्ति को कभी भी मुंह से कुछ भी न दें। डॉक्टर को बुलाओ। उपस्थित चिकित्सक द्वारा वांछित होने तक उल्टी को प्रेरित न करें। 2. यदि साँस ली जाती है: रोगी को ताजी हवा में ले जाएं और शरीर के तापमान का ख्याल रखें। यदि रोगी सांस नहीं ले रहा है या कठिनाई के साथ सांस नहीं ले रहा है, तो कृत्रिम श्वसन दें, अधिमानतः मुंह से मुंह तक सांस लेने के साथ। एक चिकित्सक से परामर्श करें 3. त्वचा के संपर्क के मामले में: शरीर के प्रभावित हिस्से को साबुन और बालों सहित पानी और नाखूनों के नीचे अच्छी तरह से धोएं। यदि दर्द, लालिमा या जलन बनी रहती है, तो डॉक्टर से परामर्श करें। सभी दूषित कपड़ों को अलग किया जाना चाहिए और उपयोग करने से पहले साबुन और पानी से अलग से अच्छी तरह धोया जाना चाहिए। 4. आंखों के संपर्क के मामले में: कम से कम 15 मिनट के लिए बहुत सारे पानी से धीरे से कुल्ला। यदि दर्द, जलन, लालिमा या फोटोफोबिया बनी रहती है, नेत्र विशेषज्ञ से परामर्श करें। **लक्षण-** तीव्र नशा के लक्षण केवल अनिर्दिष्ट और क्षणिक थे। नशा केवल तभी कल्पना की जा सकती है जब बड़ी मात्रा में निगला जाए। **सिफारिशें-** प्रोपेक्विज़ाफॉप 10% ईसी एक उभरने के बाद खरपतवारनाशक है जो मुख्य रूप से कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, उड़द, टमाटर, ग्वार, तिल, चना, मिर्च और प्याज़ में मोनोकोट खरपतवारों के खिलाफ प्रभावी है। **चेतावनी :** लेबल और पत्रक पर जो अभिदत्त है, उससे भिन्न अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। मात्रा के लिए कृपया लीफलेट देखें। खाली डिब्बों का दोबारा इस्तेमाल करना खतरनाक है।

cropnosys

PROCROP™

Propaquizafop 10% EC

Herbicide



Net Content 1L

Keep out of the reach of children. Keep in a cool and dry place away from heat and open flame.



बच्चों की पहुँच से दूर रखें। सूखी एवं ठंडी जगह पर खुली आग से दूर रखें।

If swallowed or symptom of poisoning occur call the physician immediately.

अगर जहर निगल लिया जाय या निगले जाने के लक्षण दिखाई दें तो तुरन्त डॉक्टर को बुलाएं।

For agricultural use only.

केवल कृषि उपयोग के लिए।

Manufactured and Marketed by

Cropnosys (India) Private Limited

Reg. office : 9th Floor, Northstar, Yelahanka, Bengaluru, Karnataka, India – 560064

Factory: Plot No. 5303 & L-5308/4, GIDC Estate, Vapi, District-Valsad, Gujarat – 396195.

cropnosys

For Consumer complaints contact our Customer Care Executive at our Reg. office address or mail-support.cropnosys@jtcrop.com /Call : +91 8029727145, Timing : Monday – Friday (9.30 AM – 06.00 PM)
Name of the Commodity : Herbicide

निर्माता और विपणनकर्ता:
कॉपनोसिस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: 9वीं मंजिल, अलिंगा नॉर्थस्टार, येलहंका, बेंगलुरु, कर्नाटक, भारत-560064
फैक्ट्री: प्लॉट नंबर 5303 और एल-5308/4, जीआईडीसी एस्टेट, वापी, जिला-वलसाड - 396191, गुजरात।
कंज्यूमर शिकायतों के लिए हमारे रजि. कार्यालय के कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से संपर्क करें या mail-support.cropnosys@jtcrop.com / कॉल करें: +91 8029727145 समय : सोमवार – शुक्रवार (सुबह 9.30 - शाम 06.00 बजे)
कमोडिटी का नाम : खरपतवारनाशक

Regn. No. : CIR-334624/2023-Propaquizafop (EC) (448)-31

Mfg. Lic. No.	: 781
Batch no./बैच संख्या	:
Date of Mfg ./निर्माण तारीख	:
Date of Exp/ समाप्ति तारिक	:
MRP (Incl. of all Taxes) (₹)	:
अधिकतम खुदरा कीमत (सभी कारों सहित) (₹)	
USP / L (₹)	:
इकाई बिक्री मूल्य / ली (₹)	
Net Content/शुद्ध मात्रा	: 1ℓ

